



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ  
СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 2712 от « 26 » июня 2020 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «АГРус», ОГРН 5087746677893

(наименование регистрата, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Карбезим, КС (500 г/л карбендазима)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 097-02-2712-1

на срок по « 25 » июня 2030 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.

№ 003071



Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата, л/га, л/т	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1,0-1,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Пыльная головня, твердая головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	- (1)
1,5	Рапс яровой и озимый	Корневые гнили фузариозно-патиозной этиологии, альтернариоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 6-8 л/т	
	Люпин	Антракноз, аскохитоз, фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, плесневение семян		
0,3-0,6	Пшеница озимая	Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	35(1)
0,5-0,6	Пшеница озимая, яровая	Мучнистая роса, гельминтоспориоз		35(1-2)
0,3-0,6	Ячмень яровой и озимый	Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания		35(1)
0,5-0,6		Мучнистая роса, гельминтоспориоз		35(1-2)
0,3-0,6	Рожь озимая	Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания		35(1)
0,5-0,6		Мучнистая роса, гельминтоспориоз		35(2)
0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса		40(3)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Карбезим, КС (500 г/л карбендазима) от 26 июня 2020 г. № 2712

1	2	3	4	5
0,6	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, мучнистая роса, склеротиниоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое стебле- вание, второе – в fazу бутонизация-начало цветения.	36(2)
1,0-1,5	Люпин	Антракноз, аскохитоз, фузариоз, септориоз, серая гниль, белая гниль	Расход рабочей жидкости – 300 л/га	-(2)

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



