

# АКСАКАЛ ПРАКТИК

КОМБИНИРОВАННЫЙ СИСТЕМНЫЙ СЕЛЕКТИВНЫЙ  
ГЕРБИЦИД ДЛЯ БОРЬБЫ С САМЫМИ ЗЛОСТНЫМИ  
ЗЛАКОВЫМИ СОРНЯКАМИ



50 г/л пиноксадена + 50 г/л феноксапроп-П-этила + 25 г/л клоквинтосет-мексила



117452, Россия, Москва, Симферопольский бульвар, д.29, к.8  
+7 (495) 287-85-36 [www.s-ah.ru](http://www.s-ah.ru) [info@s-ah.ru](mailto:info@s-ah.ru)



Идеальный граминицид для регионов с большим количеством злаковых сорняков;



Усиленный контроль основных злаковых сорняков, в частности овсюга, просовидных, метлицы и щетинников.

## РЕГЛАМЕНТ

Культура	Вредный объект	Норма расхода препарата, л/га	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания / кратность обработок
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые (овсюг, овес падалица, просо куриное, виды щетинника, просо сорнополевое, просо волосовидное, метлица виды, лисохвост мышехвостиковый) сорняки.	0,4-0,6	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа – конец кущения) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.	60(1)

